



université PARIS-SACLAY

TCHOURI SOUS L'OEIL DE ROSETTA

De forme surprenante en deux lobes et de forte porosité, le noyau de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko (surnommée Tchouri) révèle une large gamme de caractéristiques grâce aux instruments MIRO, VIRTIS et OSIRIS de la mission Rosetta de l'ESA, à laquelle participent notamment des chercheurs du CNRS, de l'Observatoire de Paris et de plusieurs universités dont l'UVSQ, avec le soutien du CNES.

Au nombre de sept, leurs études, publiées le 23 janvier 2015 dans Science, montrent également que la comète est riche en matériaux organiques et que les structures géologiques observées en surface résultent principalement de phénomènes d'érosion. L'instrument RPC-ICA a quant à lui retracé l'évolution de la magnétosphère de la comète alors que l'instrument ROSINA cherche les témoins de la naissance du Système Solaire.

▪ Le noyau de 67P/Churyumov-Gerasimenko

Les images de la comète 67P prises par la caméra OSIRIS montrent une forme globale inhabituelle composée de deux lobes séparés par un « cou » dont l'origine demeure inexpliquée. Sa surface de composition globalement homogène présente une grande diversité de structures géologiques qui résultent des phénomènes d'érosion,

d'effondrement et de redéposition. L'activité de la comète, surprenante à grande distance du soleil, se concentre actuellement dans la région du « cou ». L'ensemble des images a permis de réaliser un modèle en trois dimensions de la comète et la topographie détaillée du site original d'atterrissage de Philae. Combiné avec la mesure de la masse, ce modèle a donné la première détermination directe de la densité d'un noyau cométaire qui implique une très forte porosité. Ce modèle fournit également le contexte « cartographique » pour l'interprétation des résultats des autres expériences.

▪ **Les propriétés de surface de 67P/Churyumov-Gerasimenko**

L'instrument MIRO a permis aux chercheurs d'établir une carte de la température de la proche sous surface de 67P. Celle-ci montre des variations saisonnières et diurnes de température qui laissent supposer que la surface de 67P est faiblement conductrice au niveau thermique, en raison d'une structure poreuse et peu dense. Les chercheurs ont également effectué des mesures du taux de production d'eau de la comète. Celui-ci varie au cours de la rotation du noyau, l'eau dégagée par la comète étant localisée dans la zone de son « cou ».

▪ **Une comète riche en matériaux organiques**

VIRTIS a fourni les premières détections de matériaux organiques sur un noyau cométaire. Ses mesures de spectroscopie indiquent la présence de divers matériaux contenant des liaisons carbone-hydrogène et/ou oxygène-hydrogène, la liaison azote-hydrogène n'étant pas détectée à l'heure actuelle. Ces espèces sont associées avec des minéraux opaques et sombres tels que des sulfures de fer (pyrrhotite ou troïlite). Par ailleurs, ces mesures indiquent qu'aucune zone riche en glace de taille supérieure à une vingtaine de mètres n'est observée dans les régions illuminées par le Soleil, ce qui indique une forte déshydratation des premiers centimètres de la surface.

▪ **La naissance de la magnétosphère d'une comète**

En utilisant l'instrument RPC-ICA (Ion Composition Analyser), les chercheurs ont retracé l'évolution des ions aqueux, depuis les premières détections jusqu'au moment où l'atmosphère cométaire a commencé à stopper le vent solaire (aux alentours de 3,3 UA2). Ils ont ainsi enregistré la configuration spatiale de l'interaction précoce entre le vent solaire et la fine atmosphère cométaire, à l'origine de la formation de la magnétosphère de « Tchouri ».

▪ **67P/Churyumov-Gerasimenko, témoin de la naissance du Système Solaire**

Formées il y a environ 4,5 milliards d'années et restées congelées depuis, les comètes conservent les traces de la matière primitive du Système Solaire. La composition de leur

noyau et de leur coma donne donc des indices sur les conditions physico-chimiques du système solaire primitif. L'instrument ROSINA de la sonde Rosetta a mesuré la composition de la coma de 67P (la coma, ou chevelure, est une sorte d'atmosphère assez dense entourant le noyau, elle est composée d'un mélange de poussières et de molécules de gaz) en suivant la rotation de la comète. Ces résultats indiquent de grandes fluctuations de la composition de la coma hétérogène et une relation coma-noyau complexe où les variations saisonnières pourraient être induites par des différences de températures existant juste sous la surface de la comète.

▪ **Les poussières de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko**

Le détecteur de poussière GIADA a déjà récolté une moisson de données (taille, vitesse, direction, composition) sur les poussières de dimensions de 0,1 à quelques millimètres émises directement par le noyau. En complément, les images d'OSIRIS ont permis de détecter des poussières plus grosses en orbite autour du noyau, probablement émises lors du précédent passage de la comète.

Les laboratoires français impliqués dans ces études sont :

- Laboratoire d'astrophysique de Marseille (CNRS/ Aix-Marseille Université)
- Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique (CNRS/Observatoire de Paris/UPMC/Université Paris Diderot)
- **Laboratoire atmosphères, milieux, observations spatiales (CNRS/UPMC/UVSQ)**
- Institut de recherche en astrophysique et planétologie (CNRS/Université Toulouse III – Paul Sabatier)
- Laboratoire de physique et de chimie de l'environnement et de l'espace (CNRS/Université d'Orléans)
- Institut de planétologie et astrophysique de Grenoble (CNRS/Université Joseph Fourier)
- Laboratoire d'étude du rayonnement et de la matière en astrophysique et atmosphères (CNRS/Observatoire de Paris/UPMC/ENS/Université de Cergy-Pontoise)
- Institut d'astrophysique spatiale (CNRS/Université Paris-Sud)
- Centre de recherches pétrographiques et géochimiques (CNRS/Université de Lorraine)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

> **Consulter le communiqué de presse**

Contacts

- Pour MIRO :

Chercheur CNRS | Dominique Bockelée-Morvan | T 01 45 07 76 05 |

dominique.bockelee-morvan@obspm.fr

- Pour VIRTIS :

Astronome de l'Observatoire de Paris | Stéphane Erard | T 01 45 07 78 19 / 06 84 52 28 88 stephane.erard@obspm.fr

- Pour RPC :

Chercheur CNRS | Jean-André Sauvaud | T 05 61 55 66 76 / 06 77 72 70 76 | jean-andre.sauvaud@irap.omp.eu

- Pour OSIRIS :

Chercheur Aix-Marseille Université | Olivier Groussin | T 04 91 05 69 72 | olivier.groussin@lam.fr

Chercheur CNRS (pour GIADA également) | Philippe Lamy | T 04 91 05 59 32 / 06 30 14 92 33 | philippe.lamy@lam.fr

- Pour ROSINA :

Chercheur Université Toulouse III – Paul Sabatier | Henri Rème | T 05 61 55 66 65 / 06 18 58 50 49 | Henri.Reme@irap.omp.eu

- Presse CNRS | Alexiane Agullo | T 01 44 96 43 90 | alexiane.agullo@cnrs-dir.fr

- Presse CNRS | Loic Bommersbach | T 01 44 96 51 51 | presse@cnrs.fr

- Contact Communication scientifique UVSQ : Annelise Gounon-Pesquet
annelise.gounon-pesquet@uvsq.fr